

Education et traitement antituberculeux cohérence ville-hôpital

Ariane Luneau-Simonet IDE CLAT 38

Groupe de travail Education thérapeutique

Réseau national des Centres de Lutte Antituberculeux

4èmes journées du GREPI

1 et 2 décembre 2016

Le check-up des facteurs associés à l'inobservance

Pas d'explication/compréhension à propos du traitement

Demandeur d'emploi

Effets indésirables

Délai d'attente, mauvais horaires

Pas d'amélioration sous traitement

Nombre et doses des médicaments

Absence de support familial ou social, SDF, populations mobiles

Prix du traitement

Éloignement des lieux de soins

Usage de **tabac**, de drogues ou d'alcool

Antécédent d'incarcération

Psychopathe

Le rôle du CLAT dans le traitement

Pour tout patient porteur d'une tuberculose, contagieuse ou non.

- Délivrance gratuite du traitement
- Prise en charge des examens complémentaires
- Assurer l'observance du traitement sur demande du médecin traitant ou de l'hôpital (parcours de soins ALD 29)



En pratique

- Environ 150 CLATs en France métropolitaine et outre-mer (au moins un par département) liste sur SPLF/Grepi/Clat/liste des clats.
- Des CLATs départementaux (par convention avec l'état), des hôpitaux et centres de santé (par habilitation)
- Des dotations en fonction du nombre de tuberculose déclarées dans le département
- **Grandes disparités quant aux moyens**

Quoi mettre en place pour quel patient?

- Plusieurs CLATs ont un véritable programme d'Education Thérapeutique du Patient autorisés par l'ARS selon les directives de l'HAS
- Les autres ont mis en place des Actions Educatives Ciblées (reconnues par ARS). Elles sont personnalisées:
 - Délivrance gratuite du ttt en totalité avec accompagnement
 - Suivi social,
 - Aide au sevrage tabagique,
 - Prise en charge des examens de surveillance (accompagnement)
 - Test de vision des couleurs
 - Service d'interprétariat par téléphone et différents outils (pilulier, livret Kof kof, documents internes au CLAT etc...)
 - Recherche de solution d'hébergement (SSR, lits halte-soins-santé)

Le tout à domicile, en squat, au CLAT, par téléphone ou par mail

Des livrets: Bligny, Kof Kof

LE TRAITEMENT

Nom commercial	Dénomination internationale	Dosage
 Rimifon 150 [®]	ISONIAZIDE	Comprimé 150 mg
 Rimifon 50 [®]		Comprimé 50 mg
 Rimacton [®]	RIFAMPICINE	Tablette 300 mg
 Rifadine [®]		Poudre à l'eau à 100 mg
 Pirilène [®]	PIRAZINAMIDE	Comprimé 500 mg
 Myambutol [®]	ETHAMBUTOL	Comprimé 400 mg
 Dexambutol [®]		Comprimé 200 mg
Médicaments contenant plusieurs antibiotiques		
 Rifator [®]	ISONIAZIDE RIFAMPICINE PIRAZINAMIDE	50 mg 120 mg 500 mg
 Rifinah [®]	ISONIAZIDE RIFAMPICINE	100 mg 300 mg

LE TRAITEMENT

Exemple 2 :
À jeun car, héral!

- Médicaments à 6 heures
- Petit déjeuner à 7 heures



LES MÉDICAMENTS DOIVENT ÊTRE PRIS ENSEMBLE, EN UNE SEULE FOIS PAR 24 HEURES, L'ESTOMAC VIDE, TOUS LES JOURS À LA MÊME HEURE.

14
15

LA TUBERCULOSE





Qu'elle soit la
Belle Maladie,
Respirato 100
www.respirato.fr

Connaître le patient

- Lors de la visite d'entourage au chevet du patient l'IDE du CLAT va aborder la question du traitement

En pratique

- Le professionnel peut paraître inquisiteur à la recherche de personnes ayant pu être contaminées
- Difficile alors d'avoir une posture éducative pour parler du traitement
- Besoin de l'avis des professionnels au contact du patient, notamment les IDE hospitaliers

Conclusion: anticiper la sortie

- Connaître les clats du département (toujours au moins une IDE par clat) ou se rendre aux réunions du réseau national des clat (15 décembre, 13 juin 2017) ouvertes aux IDE et gratuites.
- Inviter le patient à se projeter pour la suite (commander le ttt en pharmacie, le prendre à distance des repas, faire les prises de sang)
- Donner si possible **un jour de traitement d'avance**
- Transmettre au CLAT la date de sortie ++ et faire part des difficultés

