

Rappel sur l'avis du HCSP

Infections tuberculeuses latentes
Détection, prise en charge et surveillance

Mai 2019

L'avis du HCSP

Situation	Dépistage TM	Dépistage ITL	Traitement ITL
Atteint du VIH	+	+	+
Transplanté d'organe	+	+	+/-
Avant anti-TNF	+	+	+
Dialysé	+	+	+/-
Détenu	+/-	+/-	+/-
Usager de drogues	-	+/-	+/-
Sans domicile	+/-	+/-	-
Sujet contact	+	+	+
Soignant	+	+	+
Migrant	+	+ < 18 ans +/- 18-40 ans	+
Expatrié	-	+/-*	?

* IGRA préféré

Les pays de haute incidence

- ▶ le continent africain dans son ensemble ;
- ▶ le continent asiatique dans son ensemble, à l'exception du Japon ;
- ▶ l'Océanie, à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle Zélande, de Samoa et de Tonga ;
- ▶ Le Proche-Orient et le Moyen-Orient, à l'exception de Chypre, des Emirats Arabes Unis, d'Israël, de la Jordanie et d'Oman ;
- ▶ l'Amérique centrale et du Sud et les Caraïbes, à l'exception d'Antigua et Barbuda, de la Barbade, des Bermudes, de Bonaire, de Cuba, du Costa Rica, de Curaçao, des Îles Vierges et Caïman, de la Jamaïque et de Porto-Rico ;
- ▶ les pays d'Europe centrale et orientale incluant la Russie, à l'exception de la Grèce, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie ;
- ▶ en Europe du Nord, le Groenland.

Global tuberculosis report 2018. Liste en Annexe 4. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

L'OMS considère que les pays avec une incidence de tuberculose élevée sont ceux où le taux de notification de la tuberculose est supérieur à 40 cas pour 100 000 habitants par an.

(http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/bcg/en/)

(8) Avis du HCSP du 18/05/2018 relatif à la détermination d'un seuil pratique pour définir un pays de haute endémicité tuberculeuse :

<https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=668>