

## نصائح للأهل بعد التلقيح بالـ ب ث ج

### BCG

### لقاح ب ث ج = لقاح ضد السل

لقد تلقى طفلكم للتو لقاح ب ث ج BCG، داخل الأدمة (داخل الجلد)، الرجاء الاطلاع على التبعات (المضاعفات) الطبيعية الناتجة عن هذا اللقاح.

#### معلومات عامة:

لا يتسبب هذا اللقاح بالحرارة في الأيام التي تلي تلقي اللقاح ولا يتطلب أي علاج. في حال حدوث حرارة راجعوا طبيب الأسرة. جرعة واحدة تكفي طوال الحياة.

ستبدأ فعالية اللقاح بعد 2 إلى 3 أسابيع وستكون بقوتها القصوى بعد 2 إلى 3 أشهر، المهلة المتوسطة لرد الفعل بعد تلقي هذا اللقاح.

#### الحالات الممكن حصولها في نقطة الحقن:

- لا ظهور لأثر في مكان نقطة الحقن؛ لا يجب فعل شيء في هذه الحالة.
- بعد أسبوعين أو ثلاثة، يمكن أن يُظهر احمراراً (حبة (بثرة) صغيرة حمراء كالحبة التي تتسبب بها لسعة البعوضة). مضاعفتان:
  - ✓ الحبة تبقى في مرحلة الحبة: لا يجب فعل أي شيء في هذه الحالة
  - ✓ يمكن للحبة أن تأخذ شكل منتفخ، متورم، يشبه خراج، ولكنه ليس خراجاً، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتم لمسه ويجب أن يتم انتظار السائل حتى يخرج وحده.
- يمكن أن يحدث تسرب من هذه الحبة في بعض الحالات، سيلان مصفر اللون، غير متقيح خلال 3 إلى 8 أسابيع. في هذه الحالة، ينصح بالتنظيف بالماء والصابون، مرة واحدة في اليوم على الأقل، حتى التئام الجرح.

**جميع هذه المضاعفات طبيعية ولا يجب أن تقلقكم. وتشفى لوحدها تاركة بقعة صغيرة وردية اللون تليها ندبة لقاح.**

#### نصائح في حال وجود سيلان مطول

- عدم محاولة علاج الجرح بالبودرة أو المراهم المعقمة والمعالجة للجروح.
- وضع ضمادة صغيرة جافة ومعقمة مثبتة بلفافات شاش لتجنب احتكاك الثياب. تجنب الضمادات التي لها لاصق التي يمكن أن تتسبب بردات فعل حساسية موضعية.
- تعريض ذراع الطفل للشمس عندما يكون الفصل مناسباً
- في حال السباحة المطولة، وضع ضمادة مضادة للماء.
- تجنب ارتداء ملابس ضيقة للحد من الاحتكاك.

من أجل أية معلومات محددة حول مضاعفات هذا اللقاح، يمكنكم الاتصال بي على الرقم

د. جونيفيف غرافيل - بايون  
طبيبة منسقة