PASHTO

د BCG واکسین وروسته د مور او پلار لپاره مشورې

د BCG واکسین = د نري رنځ پروړاندې واکسین

ستاسو ماشوم ته همدا اوس د BCG واکسین **په ځرمن کې** وهل شوې دی، مهرباني وکړئ د دې واکسین سره تړلې بیلا بیل **نورمال پایلې** لاندې وګورئ.

عمومي معلومات :

د دې واکسین وهلو وروسته **تبه نه راولي** او هیڅ ډول درملنې ته اړتیا نلري. او که چیرې تبه راشي نو د ډاکټر سره مشوره وکړئ.

په ټول ژوند کې د دې واکسین یوازې یو خوراک کافي دی.

د دې واکسین اغیز به له 2 تر 3 اونیو کې پیل شي او په 2-3 میاشتو کې به وده وکړي، د دې واکسین وروسته د غبرګون اوسط وخت.

په وهل شوي ځای د انجیکشن احتمالی اغیزی :

– په وهل شوي ځای د انجکشن عکس العمل نشتوالې ؛ په دغه صورت کې هیڅ نه کول.

– **په دوه یا دریو اونیو کې**، لږ سوروالې ممکن ده چې راشي (کوچنې سور داغ، لکه چې یو ماشي ټک ورکړې وي). په داسې صورت کې 2 خبرې کیدې شي :

✓ ممکن ده چې دغه سور داغ فقط **داغ** پاتې شي : پداسې صورت کې هیڅ نه کول

✓ ممکن ده چې دغه سور داغ وپرسیږي، کوم چې د یو دانه یا زخم په څیر ښکاري، **مګر دا زخم یا دانه نده**، دا خبره مهمه ده چې دغه زخم یا دانه ته **لاس ورنکړئ او انتظار وکړئ چې مایع پخپله راوځي**. ممکن ده چې دغه سور داغ وبهیږي او په ځینو حالتونو کې د 3 څخه تر 8 اونیو پورې **یو کوچنی ژیړ او نه پاکیدونکي** رطوبت تولید کړي. پداسې حالت کې، سپارښتنه کیږي چې په **صابون او اوبو سره یې پاک کړئ**، لږترلږه په ورځ کې یو ځل، تر څو چې داغ روغ شوی نه وي.

دا ټول عکس العمل معمول دي او تاسو باید اندیښمن نشئ. دا په خپله رغیږي او یو کوچنی ګلابي خال پریږدي کوم چې به د واکسین داغ ته لاره ورکړي.

د اوږدې مودې پورې د بهیدو په صورت کې ځینې لارښوونې

– د ناروغی ضد او شفاهي پاؤډر یا مرطوبونو سره درملنه مه کوئ
– له میکروب پاکه وچه او کوچنی پټی پرې ولګوئ ترڅو د جامو سره د لګیدو مخه ونیسي. د داسې پلستري پانسمان یا پټی څخه ډډه وکړئ کوم چې ځایي حساسیت رامینځته کوي
– په دوبي یا اوړي کې، خپل لاس لمر ته ښکاره کړئ
– د اوږ وخت لپاره لامبلو په حالت کې، داسې بنداژ یا پانسمان ولګوئ کوم چې د اوبو په وړاندې مقاومت لري
– د تنګو جامو اغوستلو څخه ډډه وکړئ ترڅو جامې د زخم سره و نه لګي.

د دې واکسین د پایلو په اړه د کوم وضاحت لپاره، تاسو ما ته په دغه لاندې ادرس رسیدلی شئ

Dr Geneviève GRAVIL-BAILLON
کوارډینیټر ډاکټر

CLAT 74 SUD
Tel : 04 50 63 64 89
Fax : 04 50 63 64 90
Mail : clat74sud@ch-annecygenevois.fr

Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l'hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy
www.ch-annecygenevois.fr