

CONSELHOS AOS PAIS NA SEQUÊNCIA DA VACINAÇÃO BCG

Vacina BCG = vacina contra a tuberculose

A sua criança vem de fazer a vacina do BCG, por **via intradérmica**, abaixo queira encontrar as diferentes sequências normais ligadas a esta vacina.

Informações gerais :

Esta vacina **não provoca febre** nos dias que seguem à vacinação et não necessita nenhum cuidado particular. No caso de febre, consulte o seu médico de família.

Basta uma só dose ao longo de toda a vida.

A eficácia da vacina começará dentro de 2 a 3 semanas e será máxima dentro de 2-3 meses, duração média da reacção no seguimento a esta vacina.

Situações possíveis no ponto de injeção :

- Sem reacção no ponto de injeção ; neste caso, não há nada a fazer.

- **Em duas ou três semanas**, pode apresentar uma pequena vermelhidão (pequena borbulha vermelha como uma borbulha de picadela de mosquito). 2 evoluções :

√ a borbulha fica no estado de **borbulha** : neste caso, não há nada a fazer.

√ **a borbulha** pode tomar um aspecto inchado, empolado, que se parece com um abcesso, **mas não é um abcesso**, sobretudo **não lhe toque e espere que o líquido saia por si mesmo**.

Esta borbulha pode escorrer e produzir em certos casos, **um pequeno corrimento amarelado**, não purulento, durante 3 a 8 semanas. Nesse tipo de caso, é recomendado **limpar com água e sabão** , ao menos uma vez por dia, até à cicatrização.

Todas estas reacções são normais e não é necessário preocupar-se. Curam espontaneamente deixando uma pequena marca rosada que por sua vez dará lugar a uma cicatriz vacinal.

CONSELHOS EM CASO DE CORRIMENTO PROLONGADO

- Não procurar cicatrizar com pós ou pomadas desinfectantes e cicatrizantes
- Aplicar uma pequena compressa seca estéril mantida por uma faixa de gaze para evitar a fricção da roupa. Evitar o penso com adesivo que pode criar reacções locais alérgicas
- Durante a bela estação expor o seu braço ao sol
- No caso de banhos prolongados, colocar um penso que resista à água
- Evitar a roupa demasiadamente apertada para limitar a fricção

Para mais informações sobre as consequências desta vacina, pode contactar-me ao

Doutora Geneviève GRAVIL-BAILLON
Médico coordenador

CLAT 74 SUD
Tel : 04 50 63 64 89
Fax : 04 50 63 64 90
Mail : clat74sud@ch-annecygenevois.fr

Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l'hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy
www.ch-annecygenevois.fr