

САВЕТИ РОДИТЕЉИМА
ПОСЛЕ ПРИМАЊА БСЖ ВАКЦИНЕ

БСЖ – вакцина против туберкулозе

Ваше дете је примило БСЖ вакцину у **поткожно ткиво**. У даљем тексту можете прочитати које су различите **уобичајене реакције** на ову вакцину.

Опште информације:

Током неколико дана, после примања вакцине, ова вакцина не изазива високу температуру и не захтева никакву негу. У случају да се повишена температура ипак јави, обратите се вашем лекару.

Једна доза вакцине пружа заштиту која траје целог живота.

Вакцина почиње да делује у року од 2 до 3 недеље а максимално дејство достиже у року од 2 до 3 месеца, колико у просеку траје реакција на вакцину.

Могућа стања на месту убода:

- Одсуство реакције на месту убода: не захтева никакву негу.
- **У року од две до три недеље**, појава благог црвенила (и мале црвене избочине, попут убода комарца). Две могућности развоја ситуације:
 - ✓ Нема промена на избочини: не захтева никакву негу.
 - ✓ Може доћи до надутости и отицања израслине која почиње да личи на чир, **али није чир** и никако га **не треба дирати већ сачекати да течност сама исцури**. Избочина може да цури, а у појединим случајевима, током 3 до 8 недеља формира **се жућкаста течност**, која није гнојна. У таквим случајевима препоручујемо да **то место оперете сапуном и водом**, бар једном дневно, све док потпуно не зарасте.

Све ове реакције су потпуно нормалне и не би требало да Вас брину. Нестају саме од себе и оставе за собом само малу, розикасту тачку након које се формира ожиљак од вакцине.

САВЕТИ У СЛУЧАЈУ ДУЖЕГ ЦУРЕЊА

- Не покушавајте да поспешите зарастање употребом пудера или помада за дезинфекцију и зарастање.
- Ставите малу, суву, стерилну облогу коју можете да причврстите завојем од газе како бисте избегли трење у додиру са одећом. Немојте користити завој са лепљивом траком која може да изазове локалне алергијске реакције.
- Уколико је лепо време, излагати руку сунцу.
- У случају дужег купања, ставити водоотпорни завој.
- Избегавајте сувише тесну одећу да бисте ограничили трење одеће.

За сваку информацију у вези са реакцијама на вакцину можете се обратити

Др. Женевјев Гравил-Бајон
Лекару-координатору