

**ПОРАДИ БАТЬКАМ ПІСЛЯ
ВАКЦИНАЦІЇ БЦЖ
Вакцина БЦЖ = вакцина
проти туберкульозу**

Державний міжрайонний центр здоров'я
Служба : CLAT 74 Sud
(Центр боротьби з туберкульозом)
Др Женев'єв ГРАВІЛЬ-БАЙОН
N° в реєстрі мед.працівників : 10003131751
Секретаріат : 04 50 63 64 89
clat74sud@ch-annecygenevois.fr

Вашій дитині паровели вакцинацію БЦЖ підшкірним введенням, ознайомтесь з наведеною нижче інформацією про різні нормальні наслідки та реакції, пов'язані з цією вакциною.

Загальна інформація :

В наступні дні після вакцинації БЦЖ **температура не піднімається** і не потрібно жодного лікування. У випадку, якщо є температура, звертайтеся до вашого сімейного лікаря.

Однієї дози вакцини вистачає на ціле життя.

Захисний ефект від вакцини починає розвиватися через 2-3 тижні і стане максимальним через 2-3 місяці, що відповідає середньому часу реакції на цю вакцину.

Можливі реакції в місці ін'єкції :

- Немає жодної реакції; в такому випадку не потрібно нічого робити.
- **Через два або три тижні**, може з'явитися маленька червона пляма (маленька червона точка, схожа на реакцію на укуси комарів). Може розвиватися в 2-х напрямках :
 - ✓ Точка залишається в стадії **точки** : в такому випадку не потрібно нічого робити.
 - ✓ Точка розпухає, набрякає, починає бути схожою на абсцес, **але це не є абсцес**. В жодному разі **не слід до неї доторкатися і треба почекати, щоб рідина витекла сама**. Ця точка може сочитися і давати в деяких випадках **незначне жовтувате виділення**, без гною, протягом 3-8 тижнів. В такому випадку рекомендується **промивати її водою з милом**, хоча б раз в день, до загоєння.

Всі ці реакції нормальні і не повинні вас непокоїти. Вони загоюються спонтанно, залишаючи маленьку рожеву пляму, що перетворюється в шрам від вакцинації.

ПОРАДИ У ВИПАДКУ ТРИВАЛИХ ВИДІЛЕНЬ

- Не пробувати прискорювати загоєння прикладанням різних порошків або мазей для дезинфекції або загоєння.
- Прикладати маленький сухий стерильний компрес з марлевою пов'язкою, щоб не натирати шкіру одягом. Уникати лейкопластирів, який може викликати місцеву алергічну реакцію.
- Влітку виставляти руку на сонце.
- При довгому купанні накладати пов'язку з матеріалу, що не боїться води
- Уникати надто тісного одягу, щоб не натирати шкіру.

Для отримання роз'яснень про можливі наслідки цієї вакцини можете мені телефонувати за номером 04 50 63 64 89.

Др Женев'єв ГРАВІЛЬ-БАЙОН
Лікар Координатор Центру боротьби з туберкульозом 74 Sud