

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ

Вакцина БЦЖ = вакцина против туберкулеза

Вашему ребенку только что была сделана вакцина БЦЖ **внутрикожным введением**. Ниже приведены различные **нормальные последствия**, связанные с этой вакциной.

Общая информация:

Эта вакцина **не вызывает лихорадки** в первые дни после вакцинации и не требует ухода. В случае повышения температуры обратитесь к лечащему врачу.

В течение жизни достаточно одной дозы.

Вакцина начнет действовать через 2-3 недели и достигнет максимума через 2-3 месяца (среднее время реакции на эту вакцину).

Возможные реакции в месте укола:

- В случае отсутствия реакции в месте укола каких-либо действий предпринимать не следует.
- **Через две-три недели** может появиться небольшое покраснение (небольшой красный прыщ, похожий на укус комара). Возможны 2 случая:
 - ✓ Прыщ останется **прыщом**: в этом случае не следует предпринимать каких-либо действий.
 - ✓ Прыщ может распухнуть, вздуться и стать похожим на гнойное воспаление. Однако **это не гнойное воспаление**: важно **не трогать его и дождаться, пока жидкость выйдет сама**. В некоторых случаях в течение 3-8 недель из прыща может выделиться жидкость, могут появиться **небольшие желтоватые негнойные выделения**. В этом случае рекомендуется не реже одного раза в день **очищать кожу водой с мылом** до заживления рубца.

Все эти реакции нормальны и не должны вас беспокоить. **Они пройдут сами**, и на месте прививки вначале появится небольшое розовое пятно, а затем – прививочный шрам.

СОВЕТ В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ

- Не пытайтесь лечить с помощью дезинфицирующих и заживляющих порошков или мазей.
- Приложите небольшой стерильный сухой компресс и закрепите его марлевой повязкой, чтобы защитить место прививки от трения одежды. Не используйте повязки с липкой лентой, которая может вызвать местные аллергические реакции.
- Летом выставляйте руку на солнце
- В случае продолжительного пребывания в воде наденьте водостойкую повязку.
- Не носите слишком тесную одежду, чтобы ограничить трение.

Для любых разъяснений относительно последствий этой вакцины вы можете связаться со мной по

Д-р Женестьева ГРАВИЛЬ-БАЙОН
Врач-координатор