

القواعد الذهبية السبعة

1 اترك مكان اللقاح مكشوفاً قدر الإمكان

2 لا تلبس ملابس ضيقة فوق مكان الحقن

3 في حال حدوث سيلان من مكان الحقن ضع ضمادة جافة

4 لا تضع أي مرهم أو كريم أو مادة جلدية فوق مكان التلقيح

5 لا تعط المضادات الحيوية

6 يسمح بالحمام بعد التلقيح. ولكن، تجنّب السباحة في المسبح أو البحر في حالة حدوث سيلان من مكان الحقن.


7 يجب استشارة في الحالات التالية:

- يكون التورّم مكان الحقن أكثر من 3 سم
- تألم واضح عند التحرك
- زيادة واضحة لحجم العقدة اللمفاوية تحت الذراع ولينها (التقيح)

معلومات عن لقاح الـبي. سي. جي BCG

مركز مكافحة مرض السل بمايين (CLAT 53)

المركز الاستشفائي Centre Hospitalier
33 Rue du Haut Rocher
CS 91 525
53000 LAVAL
الهاتف : 02 43 66 50 55
البريد الإلكتروني : clat53@chlaval.fr



أعراض اللقاح

مرض السل


السل هو مرض جرثومي تسببه البكتيريا المسماة بعصية السل. تنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق السعال أو رزاز اللعاب عند حدوث تواصل مُقَرَّب ومُكرَّر.



إنّ علامات المرض هي قبل كلّ شيء، السعال والحمى والتعب وفقدان الشهية مع نقصان في الوزن والتعرّق في الليل.



- يُنصح بشدّة تلقّح طفلك منذ الولادة وحتى سنّ 15 من العمر في الحالات التالية:
- إذا كنت تقيم مقاطعة إيل دو فرانس (مهما كانت المحافظة وظروف العيش)، أو بغيانا الفرنسية أو مايوت
- وُلد طفلك في البلدان التي يستوطنها وباء السل
- طفلك له على الأقل واحد من الأبوين من أصول البلدان التي يستوطنها وباء السل
- طفلك سوف يُقيم شهرا على الأقل في بلد يستوطنه الوباء
- عائلة طفلك لها سوابق لمرض السل
- طفلك في حالة مشخصة من الطبيب مُعرّض لعصية السل



التأثيرات الجانبية للبي سي جي BCG

لقاح البي. سي. جي BCG

إنّ لقاح البي. سي. جي BCG هو لقاح مُخصَّص للحماية من مرض السل. ومنذ سنة 2007، لم يعد هذا اللقاح إجباري. وهو منصوص به عند الأطفال الأكثر عرضة لمرض السل منذ الولادة وإلى غاية السن 15 سنة.



في العادة، لا يثير لقاح البي سي جي ردة فعل عامة ولا يصيب بحمى ولا بتعب. ولكن سينتج عنه انتثار ويصبح الجلد مكان الحقن على شكل قشرة البرتقال ويزول في غضون دقائق.



خلال 48 ساعة الأولى، هناك احتمال ظهور تسميط جلدي (احمرار وارتكاس جلدي)



خلال الثلاثة 3 أشهر بعد اللقاح، من الطبيعي أن يوجد ارتكاس جلدي مكان الحقن الذي ينتج عنه طفح جلدي قد يصطحب بسيلان. وقد يتخذ هذا الطفح بعض الأشهر ليزول تماما. ومن الطبيعي تورّم عقدة لمفاوية تحت الإبطن من جهة التطعيم.



- هذا اللقاح هو لقاح من العصيات المضعفة الحية.
- إنّ الغاية الرئيسية من هذا اللقاح هي حماية الأطفال الصغار من الأشكال الخطيرة لمرض السل في 75% من الحالات (مثل التهاب السحايا السلي والسل الدخني).
- لا يمنع من العدوى بالمرض ولا يقضي على الوباء في العالم.
- بالنسبة للأطفال الذين تفوق أعمارهم 3 أشهر، يكون إجراء اختبار السلين (IDR) قبل اللقاح إجباري. وليس من الضروري مراجعة اختبار السلين (IDR) بعد اللقاح أو إعادة البي. سي. جي BCG مرات أخرى.
- يمكن إعطاء لقاح البي. سي. جي BCG في نفس اليوم مع لقاحات أخرى.

من الأساسي أن يترك اللقاح ندبة دائمة صغيرة مكان الحقن

