

七大黄金准则

1 尽量把打疫苗的胳膊常露在外面，以促进结痂。

2 衣物在接触针眼的部位不能太紧。

3 如果打针部位有少量液体流出，只需覆盖干敷料即可。

4 不要在打针部位或者淋巴结上涂抹药膏、爽身粉或其它任何产品。

5 不要使用任何抗菌素。

6 接种当日即可洗澡或淋浴。但如果打针部位有少量液体流出，则需避免接触泳池中的水或海水。

7 出现下列情况时请联系您的医生：

- 触感较硬的区域（在打针部位周围）超过 3 厘米；
- 动作时有不适感；
- 胳膊底下出现的淋巴结肉眼可见，且变软（化脓）。



卡介苗（BCG）接种的相关信息

马延省结核病防治中心（CLAT 53）

医疗中心
33 Rue du Haut Rocher
CS 91 525
53000 LAVAL
电话：02 43 66 50 55
电子邮箱：clat53@chlaval.fr



结核病

结核病是由结核杆菌感染引起的传染病。与患者近距离或反复接触时，会通过咳嗽或唾沫飞溅传染。



患病症状首先是咳嗽、发烧、疲惫及食欲不振，并伴有体重减轻和夜间盗汗现象。



卡介苗（BCG）接种



卡介苗是用于预防结核病的疫苗。从 2007 年起，卡介苗接种不再是强制性的。建议有结核病高感染风险的孩子在出生至 15 岁前进行接种。

- 这是一种减毒活疫苗。
- 卡介苗接种主要是为了预防年幼的孩子感染重症结核病（如结核性脑膜炎和粟粒性肺结核），有效率达 75%。
- 卡介苗接种不能阻止结核病的传播，也不能控制其全球流行。
- 对 3 个月以上的孩子进行接种前，必须先做结核菌素试验（IDR）。接种后无需再做结核菌素试验，也无需多次进行卡介苗接种。
- 卡介苗可以和其它任何疫苗同日接种。

疫苗接种的适应症

在下列情况下，强烈建议您在孩子出生至 15 岁前为其进行疫苗接种：

- 如果您居住在法兰西岛（无论是哪一省份，也无论生活条件如何）、圭亚那或者马约特岛；
- 您的孩子出生在一个结核病高发的国家；
- 孩子的父母中至少一人来自结核病高发的国家；
- 您的孩子将在一个结核病高发的国家生活一个月以上；
- 您的孩子有结核病家族史；
- 医生判断您的孩子有感染结核杆菌的风险。



卡介苗的副作用

通常情况下，卡介苗不会导致整体性反应，既不会出现发烧，也不会产生疲劳感。注射后会出现一个淡白色的丘疹，而且皮肤会呈现橘皮状。这一反应几分钟后便会消失。



接种后的 48 小时内可能会出现一块红斑（发红变硬）。

接种后的 3 个月内，打针部位通常会出现一个硬块，随后转化为局部性破损，或许会有液体流出。可能要等到好几个月之后才能完全结痂。接种侧的腋窝下可能有淋巴结突然出现。



痂皮脱落后会留下一个永久性的小疤痕。