

您刚进行了一次**结核菌素试验**（或结核菌素皮内注射）。通过此项试验可以评估您的身体对结核杆菌的防御力，检测是否存在潜伏性结核感染（ITL），并确定是否需要接受预防性治疗。

为了确保试验结果不出现差错，您在读取结果前需要遵守下述说明。

提示:

进行注射后要等 72 小时才能读取结果。如果在注射后的 48 小时内硬结增大也无需担忧。应该由医生或者护士来读取结果。

结核菌素试验不会导致发烧和疲惫，但有可能导致皮肤发红发痒。

需遵循的指令:

- 注射完毕约 30 分钟之后取下敷料纱布。
- 不要抓挠注射区域。若觉瘙痒难耐，可将手臂放入凉水中浸一下。
- 不要在注射部位涂抹任何药物(包括皮质激素类的药膏、灭菌剂、胶状药物.....)。

结核病的相关症状

一般症状:

- 夜间盗汗
- 发烧
- 身体状况出现异常变化:
 - ✓ 体重下降
 - ✓ 食欲不振
 - ✓ 强烈的疲劳感

肺部体征:

- 咯血
- 两三周以来持续咳嗽，尽管接受了治疗，却没有什么效果
- 胸痛

上述各种症状可能是结核病的表现。

如果您身上出现了一种或多种此类症状，请尽快联系您的负责医生（médecin traitant）或者马延省结核病防治中心（CLAT）。

某些治疗方法会降低身体的免疫力，例如长时间的皮质激素疗法（每日超过 10 毫克的剂量）或者抗 TNF 治疗（Enbrel®、Rémicade®、Humira® 等药物），从而增加患结核病的风险。

马延省结核病防治中心 (CLAT)

拉瓦勒 (Laval) 医疗中心

33 Rue du Haut Rocher

53000 LAVAL

☎ 02 43 66 50 55

✉ clat53@chlaval.fr