

تم لفائدتك إجراء اختبار السلين (أو اختبار السلين داخل الجلد بالحقن). هذا الاختبار يسمح بتقييم مدى دفاع الجسم ضدّ عصابة السل والكشف عن العدوى الكامنة للسل وإقرار ما إذا كان العلاج الوقائي ضروري.

يجب احترام بعض التعليمات إلى غاية قراءة الاختبار لكي لا تؤثر على النتائج.

للعلم:

بما أنه لا يمكن قراءة الاختبار إلا بعد اثنان وسبعون 72 ساعة من الحقن، لا تقلق عندما يتغيّر حجم الارتكاس الجلدي خلال الثماني وأربعون 48 ساعة الأولى. إنّ هذه القراءة سوف تتم من قبل الطبيب أو الممرضة.

إنّ إجراء اختبار السلين العيادي لا يعرّض إلى حمى ولا يُسبّب في شعور بالتعب. ولكن، يمكن أن تظهر بعض علامات احمرار مرفوقة بحُكّاك.

التعليمات التي يجب احترامها:

- ◀ يجب إزالة الضماد 30 دقيقة تقريبا بعد الحقن
- ◀ لا تقم بحكّ مكان الحقن. في حالة حُكّاك، مرّر ذراعك تحت بعض الماء البارد.
- ◀ لا تضع شيئا على موقع الحقن (مسحوق من نوع الكورتكويد، مطهر، تصميج...)

أعراض مرض السل

العلامات العامة:

- ◀ التعرّق ليلا
- ◀ الحمى
- ◀ تغيّرات الصحة العامة:
- ✓ فقدان الوزن
- ✓ فقدان الشهية
- ✓ الشعور بالتعب الشديد

العلامات الرئوية:

- ◀ خروج دم مع السعال
- ◀ السعال الذي يستمرّ لأكثر من 2 أو 3 أسابيع أو الذي لا يتعافى منه المريض
- ◀ ألم في الصدر

عند تعرّضك لهذه الأعراض، هناك احتمال تعرّضك للإصابة بمرض السل لا تتردّد في الاتصال بطبيبك المباشر أو بمركز مكافحة مرض السل CLAT إذا كانت لديك واحدة أو أكثر من هذه العلامات.

إنّ العلاج الذي يُضعف جهاز المناعة مثل العلاج بالكورتكويد على المدى الطويل (أكثر من 10 ملغ في اليوم) أو علاج ضد عامل نخر الورم (أنبريل® وريميكا® وهوميرا®...) يزيد في التعرّض لمرض السل.

مركز مكافحة مرض السل لمقاطعة لا ماين CLAT

Centre Hospitalier de Laval / المركز الاستشفائي لافال

33 Rue du Haut Rocher شارع هو روشي

53000 LAVAL لافال

02 43 66 50 55 ☎

✉ clat53@chlaval.fr

