

Acabou de fazer um **TESTE DE TUBERCULINA** (ou injeção intradérmica de tuberculina). Este teste permite avaliar as defesas do seu organismo contra o bacilo da Tuberculose, detectar uma Tuberculose Latente (TL) e decidir se é necessário fazer um tratamento preventivo.

Deve respeitar certas instruções até à leitura e avaliação do teste de modo a evitar erros no resultado.

A título informativo:

A leitura do teste é efetuada somente 72 horas após a injeção, pelo que não se preocupe caso exista uma modificação no tamanho da induração (formação rígida, densa e elevada) durante as primeiras 48 horas. A leitura será efetuada pelo médico ou pela enfermeira.

O teste tuberculínico não provoca febre nem cansaço. No entanto pode surgir um eritema (pele avermelhada) acompanhado de comichões.

Instruções a seguir:

- Retire o penso cerca de 30 minutos após a injeção
- Não coçar a zona da injeção. Caso tenha comichão, passe o braço por água fria
- Não aplique nada na zona da injeção (cremes à base de corticóides, antisépticos, gel esfoliante...)

SINTOMAS DA TUBERCULOSE

Sintomas gerais:

- Transpiração noturna
- Febre
- Alteração do estado geral :
 - ✓ perda de peso
 - ✓ falta de apetite
 - ✓ cansaço intenso

Sintomas pulmonares:

- Tosse com sangue
- Tosse persistente desde há 2 a 3 semanas apesar de seguir um tratamento médico
- Dor no peito (tórax)

Estes diversos sintomas podem revelar a doença da tuberculose

Não hesite em entrar em contacto com o seu médico de família ou com o CLAT (Centro de Luta Anti-Tuberculose) se apresentar um ou vários destes sintomas.

Os tratamentos que reduzem a imunidade tais como terapia com corticóides a longo prazo (mais de 10 mg por dia) ou tratamentos anti-TNF (Enbrel®, Rémicade®, Humira® ...) aumentam o risco de aparecimento de uma doença ligada à tuberculose.

Centro de Luta Anti-Tuberculose da Mayenne (CLAT)

Centro Hospitalar de Laval
33 Rue du Haut Rocher
53000 LAVAL

☎ 02 43 66 50 55

✉ clat53@chlaval.fr