

Vous venez d'avoir un **TEST TUBERCULINIQUE** (ou injection intradermique de tuberculine). Ce test permet d'évaluer les défenses de votre organisme contre le Bacille de la Tuberculose, de détecter une Infection Tuberculeuse Latente (ITL) et de décider si un traitement préventif est nécessaire.

Quelques consignes sont à respecter jusqu'à la lecture du test afin de ne pas fausser les résultats.

Pour information :

La lecture du test ne se faisant que 72 heures après l'injection, il ne faut pas être inquiet devant une modification de la taille de l'induration durant les premières 48 heures. Cette lecture sera réalisée par un médecin ou par une infirmière.

Le test tuberculinique ne donne pas de fièvre, il n'engendre pas de fatigue. Par contre, il peut apparaître une rougeur accompagnée de démangeaisons.

Consignes à respecter :

- Otez le pansement environ 30 minutes après l'injection
- Ne grattez pas la zone d'injection. En cas de démangeaisons, passez votre bras sous l'eau froide
- N'appliquez rien sur le site d'injection (crème à base de corticoïdes, antiseptique, gommage ...)

SYMPTOMES DE LA TUBERCULOSE

Signes généraux :

- Sueurs nocturnes
- Fièvre
- Altération de l'état général :
 - ✓ perte de poids
 - ✓ perte d'appétit
 - ✓ fatigue intense

Signes pulmonaires :

- Crachats de sang
- Toux persistante depuis 2 à 3 semaines malgré un traitement médical
- Douleur thoracique

Ces différents symptômes peuvent être des signes évocateurs de la maladie tuberculeuse

N'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin traitant ou avec le CLAT si vous présentez un ou plusieurs de ces signes.

Les traitements diminuant l'immunité tels qu'une corticothérapie au long cours (plus de 10 mg par jour) ou un traitement anti-TNF (Enbrel®, Rémicade®, Humira® ...) augmentent le risque de déclarer une maladie tuberculeuse.

Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse de la Mayenne (CLAT)

Centre Hospitalier de Laval
33 Rue du Haut Rocher
53000 LAVAL

☎ 02 43 66 50 55

✉ clat53@chlaval.fr