

Вам только что была проведена **ТУБЕРКУЛИНОВАЯ ПРОБА** (или внутрикожное введение туберкулина). Этот тест позволяет оценить защитный уровень Вашего организма против туберкулезной бациллы, обнаружить латентную туберкулезную инфекцию (ЛТИ) и принять решение о необходимости проведения профилактического лечения.

Во избежание искажения результатов, необходимо соблюдать несколько указаний до контроля реакции.

К вашему сведению:

Контроль реакции проводится лишь через 72 часа после введения препарата, не следует волноваться в случае изменения размера уплотнения в первые 48 часов. Этот контроль будет проводиться врачом или медсестрой.

Туберкулиновая проба не вызывает высокой температуры и усталости. Однако при этом может появиться покраснение, сопровождаемое зудом.

Указания, которые необходимо соблюдать:

- Снять пластырь приблизительно через 30 минут после введения препарата
- Не чесать зону введения препарата. При наличии зуда поместить руку под струю холодной воды
- Ничего не наносить на зону введения препарата (крем на основе кортикоидов, антисептик, скраб и т.д.)

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА

Общие признаки:

- Ночная потливость
- Жар
- Ухудшение общего состояния:
 - ✓ потеря веса
 - ✓ потеря аппетита
 - ✓ сильная усталость

Легочные признаки:

- Мокрота с кровью
- Кашель, не прекращающийся на протяжении 2-3 недель, несмотря на медикаментозное лечение
- Боль в грудной клетке

Эти различные симптомы могут быть признаками, характерными для туберкулезного заболевания

Просьба связаться с Вашим лечащим врачом или CLAT, если Вы заметили у себя один или несколько из этих признаков.

Курс лечения, снижающий иммунитет, такой как длительная кортикотерапия (более 10 мг в день) или лечение анти-TNF (Enbrel®, Rémicade®, Humira® ...), повышает риск возникновения туберкулезного заболевания.

Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse de la Mayenne (CLAT)
Центр по борьбе с туберкулезом при департаменте Майен (CLAT)

Centre Hospitalier de Laval
33 Rue du Haut Rocher
53000 LAVAL

☎ 02 43 66 50 55

✉ clat53@chlaval.fr