

Un suivi préventif Pourquoi ?

1

2

Pourquoi moi ?

- 1° Suite à une visite d'entourage vous êtes identifié comme ayant été au contact de la personne atteinte de tuberculose.
- 2° Vous avez été en **contact direct** avec cette personne,, ce document vous concerne personnellement.
- 3° **Ne comparez pas votre suivi à celui**



Les résultats des tests peuvent être négatifs par la prise de certains antibiotiques, par l'injection récente d'un vaccin vivant ainsi que par une immunodépression

Quel est l'intérêt de réaliser ces examens ?

- 1° **Tests tuberculiques** : test immunologique qui permet d'évaluer si vous avez respiré le bacille tuberculeux de Robert KOCH.
 - 2° **Radiographies thoraciques** : Dépister une tuberculose maladie débutante, avant les symptômes. En effet la moitié des tuberculoses débutantes sont silencieuses.
- ⇒ Ces radiographies sont le seul moyen de s'assurer que vous ne devenez pas contagieux pour vos proches.
- ⇒ Ces 2 examens sont complémentaires et indissociables, ils permettent de distinguer la tuberculose maladie de l'infection tuberculeuse latente (ITL)



Pourquoi un suivi suite à un contact ?

- 1° Le but de ce suivi est de détecter une tuberculose ou une infection tuberculeuse latente si vous en êtes atteint
- 2° C'est aussi une mesure de santé publique collective en cassant la chaîne de contagion.

Qui est la personne malade ?

La personne malade peut-être quelqu'un de votre entourage familial, amical, professionnel, ou autre (association, hospitalier...)

Nous sommes soumis au secret médical, nous ne pouvons vous révéler l'identité de la personne malade.

Un suivi : Quels examens ? A quelle fréquence ? Quelle durée ?

- 1° **Consultation infirmière et/ou questionnaire de santé** : Lors de chacune de vos venues : à la recherche de symptômes évocateurs de tuberculose.
- 2° **Test tuberculique** : 2 tests à 3 mois d'intervalle, selon la date du dernier contact contaminant
- 3° **Radiographie thoracique** : sur une durée de 2 ans. Selon votre contact les échéances de ces radiographies sont différentes

⇒ **2 ans pendant lesquels vous êtes le plus à risque de développer la maladie**



Votre suivi est protégé par ce même secret.



Si ce diagnostic devait être posé, vous rencontreriez un médecin du CLAT, avec lequel vous échangerez sur les conduites à tenir les mieux adaptées à votre situation (*traitement préventif et/ou suivi radiologique rapproché*)



Qu'est ce qu'une infection tuberculeuse latente ?

Elle est dépistée suite à un test tuberculique mesuré au-dessus de certaines valeurs, chez une personne en bonne santé apparente et dont la radiographie thoracique est normale. Cela révèle que vous avez respiré le bacille de Koch. Ce bacille est « endormi » en vous mais pourrait se « réveiller ».

- ⇒ **La radiographie thoracique étant normale, vous n'êtes ni malade, ni contagieux.**
- ⇒ **En cas de baisse de vos défenses immunitaires, il y a un plus fort risque d'évolution vers la tuberculose maladie. Un traitement préventif évite cette évolution.**



Centre de Lutte Anti Tuberculeuse
3, rue Sarrelouis
67000 Strasbourg
Tél : 03 68 33 87 50