

Type de suivi		Durée	1 ^{er} RDV	2 ^{ème} RDV	Suite du suivi
Sujet contact TB contagieuse	Sphère personnelle (famille, amis)	2 ans	→ IDR + RX thoracique → Si dernier contact de + de 2 mois, passage direct 2 ^{ème} RDV (IDR1 = IDR2)	→ IDR + RX thoracique, 3 mois après le dernier RDV → Arrêt du suivi si IDR négative et RX normale	→ RX thoracique tous les 3 mois pour année 1 → RX thoracique tous les 6 mois pour année 2 → Arrêt du suivi
	Sphère professionnelle / collective				→ RX thoracique tous les 6 mois pendant 2 ans → Arrêt du suivi
	TB multi-résistante	3 ans		→ IDR + RX thoracique, 3 mois après le dernier RDV	→ RX thoracique tous les 3 mois pour année 1 → RX thoracique tous les 6 mois pour année 2 et 3 → Arrêt du suivi
	Enfant de – de 2 ans	3 mois	→ IDR + RX thoracique → Consultation médicale → Mise en place du TTT préventif de 3 mois de façon systématique → Si dernier contact de + de 2 mois, (IDR1 = IDR2)		→ Consultation médicale 1x/mois jusqu'à la fin du traitement → Au bout de 3 mois, RX thoracique + IDR de contrôle → Si TTT toujours en cours (en cas d'inobservance, de TTT de + de 3 mois) → arrêt du TTT si IDR négative et RX normale → Arrêt du suivi
	Immunodéprimés	2 ans	→ IDR + RX thoracique → Consultation médicale → Si dernier contact de + de 2 mois, passage direct 2 ^{ème} RDV (IDR1 = IDR2)	→ Consultation médicale → IDR + RX thoracique, 3 mois après le dernier RDV	→ RX thoracique tous les 3 mois pour année 1 → RX thoracique tous les 6 mois pour année 2 → Arrêt du suivi

Sujet contact TB non contagieuse	Personnes vivant sous le même toit de + de 18 ans	1 seul RDV	→ RX thoracique, pour une recherche de cas source	→ Arrêt du suivi, si RX normale	
	Personnes vivant sous le même toit de – de 18 ans		→ IDR + RX thoracique	→ Arrêt du suivi, si RX normale et IDR	
	Personnes vivant sous le même toit en collectivité (type EHPAD)		→ RX thoracique	→ Arrêt du suivi, si RX normale	
Infection tuberculeuse latente	Sous traitement	3 mois	→ RX thoracique SI pas de radio de – d'1 mois + consultation médicale avec prescription du traitement	→ En fin de TTT, RX thoracique + consultation médicale	→ Arrêt du suivi, si RAS
	Non traitée (refus / CI / intolérance, inobservance)	2 ans	→ RX thoracique tous les 3 mois pour année 1 → RX thoracique tous les 6 mois pour année 2 → Consultation médicale en supplément SI demande du médecin		
Suivi primo-arrivants	Personne mineure	2 ans, à compter de la date d'arrivée en France	→ IDR + RX thoracique → Si IDR négative, RX normale datant de – d'1 mois, et arrivée en France/Europe depuis + de 2 mois → Arrêt du suivi	→ RX thoracique → A réaliser 1x/an pendant 2 ans, à compter de la date d'arrivée en France/Europe	
	Personne majeure		→ RX thoracique 1x/an, en tenant compte de la date d'arrivée en France/Europe <i>N.B. Recherche d'infections latentes sous certaines conditions, entre 18 et 40 ans.</i>		

<p><u>Suivi à la demande de la MT, pour des professionnels exposés (spécifique en fonction des accords avec MT)</u></p>	<p>Aussi longtemps que la personne travaille au sein de la structure, et dans les 2 ans qui suivent</p>	<p>→ 1 RX thoracique / an → 1 IDR / 2 ans</p>	
<p><u>Patient atteint de TB maladie</u></p>	<p>2ans, en comptant la durée du traitement</p>	<p>→ RX thoracique (par le CLAT ou hôpital) → Début du traitement antituberculeux de 6 mois en moyenne (<i>généralement suivi à l'hôpital</i>) → En quadrithérapie = RX thoracique 1x/mois → En bithérapie = RX thoracique 1x/2mois</p>	<p>→ RX thoracique en fin de TTT puis 1x/6 mois pendant 1 an et demi (= ALD29) → Consultation médicale à chaque RDV</p>