

AP-HP. Sorbonne Université





26 av du Dr. A. Netter 75571 PARIS CEDEX 12 Standard: 01 44 73 74 75

Pneumologie Pédiatrique Centre de Référence des **Maladies Respiratoires Rares** Centre de la Mucoviscidose Email: prénom.nom@aphp.fr

Chef de service Pr. Harriet CORVOL

PU-PH

Pr. Annick CLEMENT

Praticiens hospitaliers Dr. Guillaume AUBERTIN Dr. Nadia NATHAN Dr. Jessica TAYTARD Dr. Guillaume THOUVENIN

Praticiens hospitaliers contractuels Dr. Laura BERDAH

Dr. Blandine PREVOST

Praticiens attachés Dr. Nicolas RICHARD Dr. Aline TAMALET Dr. Corinne TROADEC

Chef de clinique Dr. Audrey DUPOND-ATHENOR

Assistante partagée Dr. Lauren BITTON

Cadre infirmier Sylvie COMBETTES Tel: 01 44 73 60 71

Secrétariat Mme Nathalie LEGOUIL **Mme Patricia CARON** 

Tel: 01 44 73 66 18/61 83/66 68

Mme Méryne EUGENE Fax: 01 44 73 67 18

Hospitalisation Tel: 01 44 73 67 47 Consultations

Tel: 01 71 73 86 41

**CRCM Mucoviscidose** Infirmières : Virginie TRAVERS Mélisa ZEMOURI Tel: 01 44 73 68 77

Kinésithérapeute : Cécile COMBES

Tel: 01 44 73 86 71

**Assistante Sociale** Justine SANDRON Tel: 01 44 73 62 71 **Psvcholoaue** 

Alexia CHALLAN-BELVAL Tel: 01 44 73 65 47





Date

NOM

Age

**Poids** 

## PLAN D'ACTION EN CAS DE CRISE

## En cas de rhume ou légère toux :

Donner Ventoline dans la chambre d'inhalation ... bouffées 4 fois par jour pendant 7 jours.

## En cas de toux fréquente, sifflements audibles, sensation d'oppression :

- Donner Ventoline dans la chambre d'inhalation ... bouffées toutes les 20 minutes pendant 1 heure
- Si amélioration après 1h : donner Ventoline dans la chambre d'inhalation ... bouffées 4 fois par jour pendant 7 jours
- Si pas d'amélioration après 1h : poursuivre la Ventoline et donner Solupred ... cp de ... mg puis consulter rapidement

## En cas de toux incessante, essoufflement à la parole, panique, agitation de

- Donner Ventoline dans la chambre d'inhalation ... bouffées toutes les 20 minutes pendant 1h
- Donner Solupred ... cp de ... mg tout de suite et consulter rapidement ou appeler le 15



- Chaque bouffée doit être suivie de 5 respirations dans la chambre d'inhalation
- A tout moment de la crise, si aggravation rapide ou si gêne respiratoire importante : contacter le SAMU = 15
- Les signes graves sont :
  - Une respiration irrégulière 0
  - Une difficulté à parler 0
  - Une cyanose des lèvres
  - Signes de malaise
- Aucun de ces médicaments n'est dangereux, ils peuvent être utilisés sans retard en cas de difficulté respiratoire, même peu importante