

Dépistage de la Tuberculose Bovine chez l'homme.

Qu'a-t-on besoin de savoir ? Pourquoi je suis concerné ?



Qu'est que la tuberculose bovine?

La tuberculose bovine est une maladie infectieuse transmissible à l'homme, causée principalement par *Mycobacterium bovis* (*M. bovis*) qui infecte les bovins mais également les blaireaux, les sangliers et les cervidés.

Depuis plusieurs années, le nombre de cas de tuberculose Bovine reste préoccupant dans certains départements comme la Côte d'Or, la Dordogne, la Charente, les Pyrénées Atlantiques, les Landes, le Calvados et en Corse.

Comment se transmet-elle ?

Par voie aérienne pour les personnes en contact direct avec l'animal tuberculeux notamment si l'animal tousse.

Par voie digestive pour les consommateurs de lait cru ou de produits non pasteurisés provenant d'un animal infecté.


Comment puis-je savoir si je suis infecté(e) ?

En cas de contact étroit et répété avec un animal malade, on peut être contaminé par *M. bovis*. Nos défenses immunitaires sont théoriquement en capacité de l'éliminer. Mais, dans certaines situations *M. bovis* n'est pas totalement éliminée et peut rester « endormi ». On parle alors d'**Infection Tuberculeuse Latente**.

Si un jour, les défenses immunitaires s'affaiblissent, *M. bovis* va se « réveiller » et se multiplier. **La tuberculose maladie** peut alors se développer.

Pour savoir si quelqu'un est infecté ou malade, il faut faire un dépistage.

Qui doit se faire dépister ?



Qui est sujet contact?

Personne en contact régulier avec un animal :

- avec une atteinte pulmonaire: personnes vivant ou travaillant dans la ferme avec des contact fréquent avec l'animal

- avec une atteinte mammaire: consommateur régulier de lait cru ou produits laitiers non pasteurisés

Personne sans contact fréquent mais vivants dans la ferme ou consommateurs occasionnel de lait cru ET vulnérable (immunodéprimés...)


Où puis-je réaliser le dépistage si j'ai été exposé

- Gratuitement, au centre de Lutte Antituberculeuse


(les CLAT sont présents sur tout le territoire et coordonne le dépistage pour les personnes en contact avec un animal malade en lien avec les services vétérinaires et la Mutualité Sociale Agricole (MSA)).

- Chez mon Médecin traitant

En quoi consiste le dépistage ?

 Faire un examen médical et une radiographie thoracique pour chercher des signes de **TUBERCULOSE MALADIE**



 Une Intra Dermo Réaction (IDR) ou un test IGRA (prélèvement sanguin) pour chercher une **INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE**

Différence entre tuberculose maladie et tuberculose latente

TUBERCULOSE MALADIE PULMONAIRE



Toux, crachat, fièvre, amaigrissement



Radio pulmonaire anormale



Contagiosité Isolement



Traitement pendant 9 mois pour **guérir** de la maladie



INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE

Pas de symptôme



Radio pulmonaire normale



Pas de contagiosité Pas d'isolement



Traitement pendant 3 mois pour **prévenir** la maladie



Ou suivi radiologique

