



Sondage à propos de la tension d'approvisionnement en rifampicine (toutes formes galéniques). Sondage pour les pneumologues.

- lundi 17 juin 2024

51

- Total des réponses
- Date de création: jeudi 30 mai 2024
- Réponses complètes: 51

Q2: Votre mode d'exercice (plusieurs choix possibles)

- Réponses obtenues : 51 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Hôpital	82.35%	42
Libéral	21.57%	11
CLAT	19.61%	10
Autre (merci de préciser)	1.96%	1
Nombre total de participants: 51		

Q3: Avez-vous connaissance du dispositif de contingentement qualitatif de la rifampicine mis en place par L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

- Réponses obtenues : 51 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui	82.35%	42
Non	9.80%	5
Pas précisément	7.84%	4
TOTAL		51

Q4: Avez-vous dû renoncer à commencer certains traitements (plusieurs réponses possibles)

- Réponses obtenues : 51 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui pour des traitements d'infections tuberculeuses latentes	29.41%	15
Oui pour des traitements de tuberculoses (maladies)	3.92%	2
Nombre total de participants: 51		

Q5: Si vous avez dû renoncer à commencer certains traitements, la cause en était (plusieurs choix possibles)

- Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 34

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
La méconnaissance des pharmaciens de ville ou hospitalier concernant le dispositif mis en place pour garantir l'accès à la rifampicine dans ses indications indispensables	23.53%	4
La méconnaissance des prescripteurs concernant le dispositif mis en place pour garantir l'accès à la rifampicine dans ses indications indispensables	11.76%	2
L'impossibilité d'obtenir de la rifampicine malgré la mise en œuvre du dispositif mis en place pour garantir l'accès à la rifampicine dans ses indications indispensables	41.18%	7
Le refus des patients atteints d'infection tuberculeuse latente (6-9 mois d'isoniazide en monothérapie contre 3 mois de bithérapie auparavant)	35.29%	6
Votre propre décision de rapport bénéfice / risque	47.06%	8
Autre raison (merci de préciser)	23.53%	4
Nombre total de participants: 17		

Q6: Avez-vous dû interrompre certains traitements (plusieurs réponses possibles) ?

- Réponses obtenues : 51 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui pour des traitements d'infections tuberculeuses latentes	9.80%	5
Oui pour des traitements de tuberculoses (maladies)	9.80%	5
Non pour des traitements d'infections tuberculeuses latentes	60.78%	31
Non pour des traitements de tuberculoses (maladies)	86.27%	44
Nombre total de participants: 51		


Q7: Si vous avez dû interrompre certains traitements, la cause en était (plusieurs choix possibles)

- Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 40

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
La méconnaissance des pharmaciens de ville ou hospitalier concernant le dispositif mis en place pour garantir l'accès à la rifampicine dans ses indications indispensables	36.36%	4
La méconnaissance des prescripteurs concernant le dispositif mis en place pour garantir l'accès à la rifampicine dans ses indications indispensables	0.00%	0
L'impossibilité d'obtenir de la rifampicine malgré la mise en œuvre du dispositif mis en place pour garantir l'accès à la rifampicine dans ses indications indispensables	72.73%	8
Le refus des patients atteints d'infection tuberculeuse latente (6-9 mois d'isoniazide en monothérapie contre 3 mois de bithérapie auparavant)	9.09%	1
Votre propre décision de rapport bénéfice / risque	0.00%	0
Autre raison (merci de préciser)	27.27%	3
Nombre total de participants: 11		

Q8: Le délai pour la disponibilité de la rifampicine à partir de la présentation de votre ordonnance à la pharmacie de ville est en moyenne (en jours) :

- Réponses obtenues : 42 Question(s) ignorée(s) : 9



Q8: Le délai pour la disponibilité de la rifampicine à partir de la présentation de votre ordonnance à la pharmacie de ville est en moyenne (en jours) :

- Réponses obtenues : 42 Question(s) ignorée(s) : 9

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Inférieur à 2 jours	14.29%	6
Entre 2 et 7 jours	38.10%	16
Entre 7 et 14 jours	16.67%	7
Supérieur à 14 jours	7.14%	3
Autre (veuillez préciser)	23.81%	10
TOTAL		42

Q9: Depuis le contingentement, avez-vous prescrit davantage de formes combinées (Rifater ou Rifinah) que de rifampicine isolée ?

- Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 3

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui	10.42%	5
Non	89.58%	43
Si oui pourquoi ?	8.33%	4
Nombre total de participants: 48		

Q10: Avez-vous prescrit de la rifabutine (ANSATIPINE) à la place de la rifampicine en raison du contingentement ?

- Réponses obtenues : 50 Question(s) ignorée(s) : 1

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, souvent	0.00%	0
Oui, au cas par cas	4.00%	2
Non	96.00%	48
TOTAL		50

Q11: En ce qui concerne les mycobactéries non tuberculeuses, avez-vous modifié vos prescriptions en fonction du contingentement de la rifampicine :

- Réponses obtenues : 49 Question(s) ignorée(s) : 2

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Non	79.59%	39
Oui	6.12%	3
Si Oui, commentaire ?	14.29%	7
TOTAL		49